

COMPO EXPERT

EXPERTS  
FOR GROWTH



# Basfoliar® K Premium SL



Fertilizante Foliar  
Fórmula Líquida Bio-potenciada

[www.compo.cl](http://www.compo.cl)



# **Basfoliar® K Premium SL**

## Fertilizante Foliar, Fórmula Líquida Bio-potenciada

**Basfoliar K Premium SL** es un fertilizante foliar líquido con alta concentración de Potasio, potenciado con extractos de Algas Marinas (*Ecklonia maxima*) y Boro.



La combinación de elementos que componen **Basfoliar K Premium SL** favorecen:

- Color y tamaño del fruto.
- Formación y movilización de carbohidratos hacia el fruto (azúcares).
- Estimulación de la fotosíntesis.
- Vida post cosecha de frutos almacenados en frío.
- Tolerancia a climas fríos, enfermedades y resistencia a estrés por falta de agua.

La formulación de **Basfoliar K Premium SL** (líquido) y la alta calidad de sus materias primas evitan riesgos de fruta manchada, incluso aplicado el día antes de la cosecha.

### Composición

<b>Potasio</b> (K <sub>2</sub> O)	25% (p/v)
<b>Ecklonia maxima</b> (extracto de algas)	3% (p/v)
<b>Boro</b> (B)	1% (p/v)

### Análisis físico

Apariencia:	Líquido Transparente
pH:	5,0
Toxicidad:	No tóxico, No inflamable, No corrosivo y No peligroso
Envases:	20 L

### Recomendaciones de Uso

Cultivo	N° de aplicaciones	Dosis	Época de aplicación
Vid (de mesa y vinífera)	2 a 3	6 a 8 L/ha	Desde pinta en adelante cada 7 a 15 días.
Pomáceas	3	6 a 8 L/ha	Aplicar cada 15 a 21 días (60, 40 y 20 días antes de cosecha).
Carozos	2 a 3	3,5 L/ha	Aplicar cada 7 días en variedades tempranas y cada 15 días en variedades tardías, desde desarrollo intermedio de fruto a inicio de color.
Cerezos	2	7L/ha	Aplicar al menos 2 veces cada 5 días, 10 y 15 días antes de cosecha. Última aplicación 10 días antes de cosecha.
Kiwi	4	6 a 8 L/ha	Aplicar desde 60 días antes de cosecha, cada 15 días, 40, 50, 60 y 70 días después de plena flor.
Nogales	2	5 L/ha	Aplicar 30 y 15 días antes de pre cosecha junto con <b>Basfoliar Size SL</b> .
Olivos	1 a 2	7,5 L/ha	Aplicar cada 20 días en el último tercio de crecimiento de frutos.
Frutales de hoja persistente (Cítricos y Paltos)	2 a 3	6 a 8 L/ha	Aplicar cada 7 a 15 días a partir de la cuaja de los frutos.
Frambuesas y Arándanos	2 a 3	3 a 5 L/ha	Aplicar desde el primer cuaje de frutos, cada 10 a 12 días.
Frutillas	2 a 3	2,5 a 3 L/ha	Aplicar desde el primer cuaje de frutos, cada 10 a 12 días.
Tomates	4 a 6	6 a 8 L/ha	Aplicar desde el cuaje del 2° al 5° racimo cada 5 a 7 días.
Ajos y cebollas	2	5L/ha	Aplicar 30 y 15 días antes de cosecha.
Hortalizas y Papas	2 a 3	3 a 5 L/ha	Aplicar desde 1/3 de desarrollo del cultivo sobre la hilera, cada 10 a 15 días.

### Precauciones

**Basfoliar K Premium SL** es un producto ecológicamente compatible y biodegradable en el medio ambiente, que no presenta restricciones de carencia.

**Basfoliar K Premium SL** es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto para el manejo seguro es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con que haya sido mezclado **Basfoliar K Premium SL**.

COMPO AGRO Chile Ltda.  
Isidora Goyenechea 3621-Piso 5  
Las Condes-Santiago.  
Fono: (2) 597 8400  
Fax: (2) 597 8401  
E-Mail: info@compo.cl

#### Consultas Técnicas en Regiones:

I a IV Región: 09-9 342 0555  
V Región: 09-9 343 2222  
R.M.: 09-9 343 7821  
VI Región: 09-9 328 8780

VII Región: 09-9 344 7392  
VIII Región: 09-8 501 9958  
IX, XIV y X Región: 09-9 440 4920

#### Soporte Técnico:

Joaquín Orellana: 09-9 344 5246  
Hernán Camacho: 09-9 227 8339